

العُوار: ردّ فعل حساسي شديد

إدارة ردّ الفعل الحساسي الشديد

الإدارة

1. اتبع DRSABCD.

المريض في وعيه

1. ساعد المريض على الجلوس أو الاستلقاء في وضع يساعد على التنفس.

2. إذا كان المريض يحمل محقناً ذاتياً (مثل AnaPen®، EpiPen®) فيجب استخدامه على الفور. دع المريض يستخدم المحقن الذاتي بنفسه أو أسأله عما إذا كان يحتاج لمساعدة في ذلك.

3. أبقِ المريض في وضع الاستلقاء أو الجلوس وراقب نبضه وتنفسه وسجلهما.

4. إذا لم تحدث استجابة بعد 5 دقائق، يجوز إعطاؤه أدرنالين إضافياً.

المريض غائب عن الوعي

1. استخدم محقن الأدرنالين الذاتي فوراً إذا كان موجوداً.

الإشارات والأعراض

ابحث عن أي من الأشياء التالية كإشارة إلى وجود عُوار:

- صعوبة و/أو صفير في التنفس
- انتفاخ اللسان
- انتفاخ/تبيس في الحلق
- صعوبة في الكلام و/أو صوت أجش
- صفير و/أو سعال
- دوخة مستمرة أو انهيار
- في الأطفال الصغار: شحوب وارتخاء.

ردّ فعل خفيف إلى معتدل (قد يسبق العُوار):

- انتفاخ الشفتين، الوجه، العينين
- بثور أو حبرات
- تتميل الفم
- ألم في البطن وتقيؤ.

تفقد الموقع www.allergy.org.au للاطلاع على مزيد من المعلومات.

تحذير

العُوار هو ردّ فعل حساسي شديد ويمكن أن يشكّل تهديداً للحياة – تعامل معه دائماً كحالة طبية طارئة.

في حالة الطوارئ اتصل على الرقم ثلاثة أصفار (000) لطلب الإسعاف.

تعلم الإسعافات الأولية. تفقد الموقع www.stjohn.org.au أو اتصل على الرقم 1300 360 455.

© St John Ambulance Australia. لا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج هذه المعلومات بدون إذن خطي مسبق من الناشر. والمعلومات هذه ليست بديلاً للتدريب على الإسعافات الأولية. توصي جمعية St John بأن يتدرب الجميع على الإسعافات الأولية.