

嚴重出血的急救方法

警告

- 戴手套以避免感染。
- 若病患人事不省，請遵循 DRSABCD。
- 若傷口中有異物，在傷口兩側施壓，放護墊在物體周圍後再包紮。
- 切勿使用止血帶。（在極度嚴重出血時，像肢體受到嚴重創傷，如被鯊魚攻擊，才可使用止血帶。）

處理方法

1. 在傷口施用直壓法；讓病患自己做。若病患無法自己施壓，我們用手（戴手套）或護墊為他施壓。
2. 把病患的衣物脫掉或剪開以露出傷口。
3. 盡量將傷口密合。
4. 讓病患躺下並將傷處舉起，高於心臟。若懷疑骨折，請小心處理。
5. 包紮傷口：
 - 用護墊覆蓋傷口
 - 確保護墊覆蓋傷口上，再用綁帶固定。
 - 若血流不止，保留第一層護墊，把第二層護墊覆蓋上去，再用綁帶固定。
 - 若仍然流血不止，用新的護墊更換第二層護墊，再用綁帶固定好。
6. 定時檢查傷口的血液循環。
7. 致電三個零（000）叫救護車。
8. 再用休克的急救方法。

在緊急時請致電三個零（000）叫救護車。

若需要更多聖約翰急救培訓和急救用品的資訊，請瀏覽 www.stjohn.org.au 或致電 1300 360 455。

© St John Ambulance Australia. 所有資訊如沒有書面同意之下不可複製。此資料不可取代任何急救課程。
聖約翰建議民衆應有急救的培訓。