

蛇咬的急救方法

徵兆和症狀

- 刺孔和抓痕
- 噁心，嘔吐和拉肚子
- 頭痛
- 視力模糊或複視
- 眼皮下垂
- 傷處流血
- 呼吸困難
- 感覺虛弱，昏厥或暈眩
- 說話或吞嚥困難
- 喉嚨，胸部或腹部疼痛
- 呼吸微弱或停止
- 深色的小便

警告

- 切勿清洗皮膚上的毒液。
- 切勿割開傷口。
- 切勿吸出毒液。
- 切勿使用止血帶。
- 切勿捕捉蛇。

處理方法

1. 遵循 DRSABCD。
2. 安慰傷者躺臥休息。
3. 立刻在傷口上使用寬的彈性綁帶（縐織布）。
4. 使用壓迫制動綁帶（厚縐織布或彈性轉軸綁帶）。
 - 從手指和腳趾的上方開始施行壓迫包紮法，包紮越多肢體部分越好（包括蛇咬處）。包紮鬆緊適度以免阻礙肢體的血液循環。
5. 用夾板固定受傷的肢體。
6. 確保傷者不要移動。
7. 登記被咬傷和包紮傷口的時間；陪伴傷者，定時檢查手指或腳趾的血液循環。

在緊急時請致電三個零（000）叫救護車。

若需要更多聖約翰急救培訓和急救用品的資訊，請瀏覽 www.stjohn.org.au 或致電 1300 360 455。

© St John Ambulance Australia. 所有資訊如沒有書面同意之下不可複製。此資料不可取代任何急救課程。
聖約翰建議民衆應有急救的培訓。