

ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ



Διαχείριση πυρετικών σπασμών σε βρέφη και παιδιά

Οι σπασμοί στα βρέφη και στα παιδιά μπορεί να οφείλονται σε πυρετό, ίωση, επιληψία ή άλλες αιτίες. Οι πυρετικοί σπασμοί είναι συνήθως σύντομοι και δεν διαρκούν πάνω από 5 λεπτά.

Σημάδια και συμπτώματα

- πυρετός
- μυική δυσκαμψία
- σπασμωδικές ή νευρικές κινήσεις του προσώπου και των άκρων
- τα μάτια γυρνούν προς τα πάνω
- το πρόσωπο και τα χείλη γίνονται μπλε
- αναισθησία – απώλεια αισθήσεων

Διαχείριση

1. Στη διάρκεια των σπασμών:
 - Τοποθετήστε το παιδί στο πάτωμα για ασφάλεια
 - Γυρίστε το παιδί στο πλευρό του
 - ΜΗΝ συγκρατείτε το παιδί
2. Μετά τους σπασμούς:
 - Ακολουθήστε το σχέδιο δράσης DRSABCD.
 - Απομακρύνετε επιπλέον ρούχα ή περιτυλίγματα
 - Αναζητήστε ιατρική βοήθεια, εάν απαιτείται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ δροσίζετε το παιδί με σφουγγάρι ή κόνοντάς του μπάνιο, αλλά αφαιρέστε τυχόν επιπλέον ρούχα.

**Σε επείγουσα ανάγκη καλέστε τα τρία μηδενικά (000) για ασθενοφόρο.
Μάθετε Πρώτες Βοήθειες. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.stjohn.org.au ή καλέστε 1300 360 455.**

© St John Ambulance Australia. Αυτή η πληροφορία δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Η πληροφορία αυτή δεν αποτελεί υποκατάστατο για την παροχή πρώτων βοηθειών. St John συνιστά ότι ο καθένας πρέπει να εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών.