

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ



Διαχείριση εγκεφαλικού

Σημάδια και συμπτώματα

- αιφνίδια μείωση του επιπέδου συνείδησης
- αδυναμία ή παράλυση, ιδιαίτερα στη μια πλευρά του σώματος
- αίσθημα μουδιάσματος στο πρόσωπο, στο χέρι ή στο πόδι
- αδυναμία ομιλίας ή κατανόησης
- ανεξήγητη ζάλη
- προβληματική όραση
- απώλεια ισορροπίας
- σύγχυση

Διαχείριση

1. Ακολουθήστε το σχέδιο δράσης DRSABCD.

Ασθενής που έχει τις αισθήσεις του

- Ηρεμήστε και καθησυχάστε τον ασθενή.
- Υποστηρίξτε το κεφάλι και τους ώμους σε μαξιλάρια.
- Χαλαρώστε τα σφιχτά ρούχα.
- Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος.
- Σκουπίστε τυχόν εκκρίσεις από το στόμα.
- Διασφαλίστε ότι ο αεραγωγός είναι καθαρός και ανοιχτός.

Ασθενής αναισθητός

- Τοποθετήστε (τον ασθενή) σε θέση ανάνηψης.
2. Διασφαλίστε ότι έχει κληθεί ασθενοφόρο: τρία μηδενικά (000)

Εθνικό Ίδρυμα Εγκεφαλικού (National Stroke Foundation)

www.strokefoundation.com.au

Εάν αναγνωρίσετε τα σημάδια ενός εγκεφαλικού, δράστε ΓΡΗΓΟΡΑ: **(FAST)**

- Αδυναμία **προσώπου** (Facial)
- Αδυναμία **χεριών** (Arm)
- Δυσκολία **ομιλίας** (Speech)
- **Χρόνος** για γρήγορη δράση (Time)

© National Stroke Foundation

Σε επείγουσα ανάγκη καλέστε τα τρία μηδενικά (000) για ασθενοφόρο.

Μάθετε Πρώτες Βοήθειες. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.stjohn.org.au ή καλέστε 1300 360 455.

© St John Ambulance Australia. Αυτή η πληροφορία δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Η πληροφορία αυτή δεν αποτελεί υποκατάστατο για την παροχή πρώτων βοθηθειών. St John συνιστά ότι ο καθένας πρέπει να εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοθηθειών.