

EMERGENZA DIABETICA



Come intervenire nel caso di un'emergenza diabetica

Segnali e sintomi

Bassi livelli di zucchero nel sangue

- pallore
- fame
- sudorazione
- debolezza
- confusione
- aggressività.

Elevati livelli di zucchero nel sangue

- sete
- bisogno di urinare
- pelle calda e secca
- fiato che odora di acetone.

Gestione dell'emergenza

▼ Se il paziente non è cosciente.

1. Seguite il piano d'azione DRSABCD.
2. Non somministrate cibi o bevande per bocca.

▼ Se il paziente è cosciente.

1. Se non siete sicuri del tipo di emergenza diabetica accusata dal paziente, somministrategli una bevanda calda; questa non gli farà male.

Bassi livelli di zucchero nel sangue

1. Somministrate zucchero, glucosio o una bevanda dolce, es. una bibita o bevanda sciroppata (non bevande 'dietetiche' o prive di zucchero).
2. Continuate a somministrare zucchero ogni 15 minuti finché il paziente non si riprende. Poi dategli un tramezzino o altro cibo.
3. Se non si verificano miglioramenti, telefonate allo 000 per richiedere un'ambulanza.

Elevati livelli di zucchero nel sangue

1. Se necessario, richiedete l'intervento di un medico.
2. Se vi sono ritardi nei soccorsi, somministrate al paziente liquidi senza zucchero.

In presenza di un'emergenza, telefonate allo 000 per richiedere un'ambulanza.

Imparate i protocolli del pronto soccorso. Visitate il sito www.stjohn.org.au o chiamate il numero 1300 360 455.

© St John Ambulance Australia. Le presenti informazioni non possono essere copiate o riprodotte senza il previo consenso scritto dell'editore. Queste informazioni non sono un valido sostituto per la formazione nel campo del pronto soccorso. La St John consiglia a tutti di seguire corsi di pronto soccorso.