

CO GIẬT VÌ SỐT NẶNG



Cách đối phó co giật vì sốt nặng ở trẻ sơ sinh và trẻ em

Co giật ở trẻ sơ sinh và trẻ em có thể là vì bị sốt, nhiễm trùng, động kinh hoặc các bệnh tật khác. Co giật vì sốt nặng thường xảy ra trong thời gian ngắn, kéo dài không quá 5 phút.

Dấu hiệu & triệu chứng

- Sốt
- Cứng cơ bắp
- Mặt và chân tay co thắt hoặc co giật
- Mắt trợn lên trên
- Mặt và môi bị tím tái
- Bất tỉnh.

Cách đối phó

1. Trong lúc đang bị co giật:
 - Đặt đứa trẻ xuống sàn nhà cho an toàn
 - Lật đứa trẻ nằm nghiêng
 - ĐỪNG kiềm giữ đứa trẻ.
2. Sau cơn co giật:
 - Làm theo DRSABCD
 - Cởi bỏ bớt quần áo dư thừa hoặc vải quấn
 - Đi bác sĩ/bệnh viện nếu cần.

CẢNH BÁO

ĐỪNG làm mát đứa trẻ bằng cách lau người hoặc tắm cho bé, mà nên cởi bỏ bớt quần áo dư thừa.

Trong trường hợp cấp cứu, gọi ba số không (000) xin xe cứu thương.

Học sơ cứu. Vào trang mạng www.stjohn.org.au hoặc gọi số 1300 360 455.

© St John Ambulance Australia. Không được phép sao chép hay in lại thông tin này mà không có thư của nhà xuất bản cho phép trước. Thông tin này không thay thế cho khóa huấn luyện sơ cứu. St John khuyến mọi người nên học sơ cứu.