

RẮN CẮN



Cách đối phó với vết rắn cắn

Dấu hiệu & triệu chứng

- vết thủng hoặc trầy xước
- buồn nôn, nôn và tiêu chảy
- nhức đầu
- nhìn thấy hai hình hoặc bị mờ
- mí mắt rũ xuống
- chảy máu từ vết cắn
- khó thở
- ngầy ngật, chóng mặt hoặc bị ngất
- nói hoặc nuốt không được
- đau cổ họng, ngực hoặc phần bụng
- hô hấp yếu hoặc ngưng thở
- nước tiểu sậm màu

CẢNH BÁO

ĐỪNG rửa chất độc trên da.

ĐỪNG cắt chỗ rắn cắn.

ĐỪNG tìm cách hút nọc độc ra khỏi vết thương.

ĐỪNG sử dụng ga rô.

ĐỪNG tìm cách bắt con rắn.

Cách đối phó

1. Làm theo DRSABCD.
2. Trấn an bệnh nhân và bảo họ dừng di chuyển.
3. Dùng băng crepe bản rộng băng vết cắn càng sớm càng tốt.
4. Băng chặt
 - (băng crepe chắc bền hoặc băng cuộn thun)
 - bắt đầu ở vị trí ngay phía trên các ngón tay hoặc ngón chân của tay/chân bị rắn cắn, và chuyển dần lên chân/tay càng xa càng tốt (bao gồm cả vết rắn cắn))
 - băng chặt nhưng không chặn dòng máu chảy đến chân/tay.
5. Dùng nẹp giữ yên tay/chân đã băng bó.
6. Bảo đảm bệnh nhân không di chuyển.
7. Ghi lại giờ giấc bị cắn và khi băng bó
 - ở lại với bệnh nhân
 - kiểm tra máu tuần hoàn ở ngón tay hoặc ngón chân
 - đối phó với sốc.

Trong trường hợp cấp cứu, gọi ba số không (000) xin xe cứu thương.

Học sơ cứu. Vào trang mạng www.stjohn.org.au hoặc gọi số 1300 360 455.

© St John Ambulance Australia. Không được phép sao chép hay in lại thông tin này mà không có thư của nhà xuất bản cho phép trước. Thông tin này không thay thế cho khóa huấn luyện sơ cứu. St John khuyến mọi người nên học sơ cứu.