

NHỆN CẮN



Cách đối phó nhện cắn

Dấu hiệu & triệu chứng

- đau nhói tại vết cắn
- đỏ/toát mồ hôi đầm đìa
- buồn nôn, nôn và đau phần bụng.

Các triệu chứng khác khi bị nhện

Funnel-Web cắn:

- chảy nhiều nước miếng
- lẫn lộn dẫn đến bất tỉnh
- cơ bắp co giật và khó thở
- lông nhỏ dựng lên
- bị tê quanh miệng
- chảy nước mắt nhiều
- mất phương hướng
- mạch nhẩy nhanh
- huyết áp tăng đáng kể.

Các triệu chứng khác khi bị nhện red-back cắn:

- đau dữ dội ở vết cắn càng ngày càng đau và lan ra
- lông nhỏ dựng lên
- đỏ/toát mồ hôi chỗ có chỗ không
- nhức đầu
- cơ bị yếu hoặc co thắt.

Dấu hiệu và triệu chứng có thể xảy ra khi bị loài nhện khác cắn:

- cảm giác nóng rát
- sưng
- phồng rộp.

Cách đối phó

1. Làm theo DRSABCD.
2. Đặt bệnh nhân nằm xuống.
3. Vỗ về và trấn an bệnh nhân.
4. Áp dụng cách đối phó với:

Nhện Funnel-web/Mouse spider

1. Nếu bị cắn ở chân/tay, lấy băng bản rộng băng chặt vết cắn lại (tốt nhất là loại băng crepe) càng sớm càng tốt.
2. Băng chặt bắt đầu ở vị trí ngay phía trên các ngón tay hoặc ngón chân lên chân/tay càng xa càng tốt.
3. Giữ yên tay/chân bị cắn và bảo đảm bệnh nhân không di chuyển gì hết.
4. Bảo đảm đã gọi xe cứu thương: ba số không (000).

Nhện red-back

1. Chườm túi lạnh/gạc lạnh tại vết cắn để giảm đau.
2. Nhanh chóng đi bác sĩ/bệnh viện.

Bị loài nhện khác cắn

1. Rửa bằng xà phòng và nước.
2. Chườm túi lạnh (icepack) để giảm đau/khó chịu.
3. Đi bác sĩ/bệnh viện nếu bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng.

Trong trường hợp cấp cứu, gọi ba số không (000) xin xe cứu thương.

Học sơ cứu. Vào trang mạng www.stjohn.org.au hoặc gọi số 1300 360 455.

© St John Ambulance Australia. Không được phép sao chép hay in lại thông tin này mà không có thư của nhà xuất bản cho phép trước. Thông tin này không thay thế cho khóa huấn luyện sơ cứu. St John khuyến mọi người nên học sơ cứu.