

الحالة الطارئة المتعلقة بمرض السكري

إدارة الحالة الطارئة المتعلقة بمرض السكري

الإدارة

المريض غائب عن الوعي.

1. اتبع DRSABCD.
2. لا تعطه شيئاً عن طريق الفم.

المريض بوعيه.

إذا لم تكن متأكدًا من نوع الحالة الطارئة المتعلقة بمرض السكري التي ألمت بالمريض، أعطه شراباً حلواً، فذلك لن يؤدي إلى أي ضرر إضافي.

انخفاض مستوى السكر في الدم

1. أعط المريض سكرًا أو غلوكوز أو شراباً حلواً، مثل المرطبات أو الكورديال (وليس مشروبات الـ diet الخاصة بالحمية أو الخالية من السكر).
2. استمر في إعطائه السكر كل 15 دقيقة إلى أن ينتعش المريض. اتبع ذلك بشظيرة أو طعام آخر.
3. إذا لم يتحسن، اتصل على الرقم ثلاثة أصفار (000) لطلب الإسعاف.

ارتفاع مستوى السكر في الدم

1. اطلب المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.
2. أعط المريض سوائل خالية من السكر إذا تأخر وصول المساعدة.

الإشارات والأعراض

انخفاض مستوى السكر في الدم

- شحوب
- جوع
- عرق
- ضعف
- تشوش
- عدائية.

ارتفاع مستوى السكر في الدم

- عطش
- حاجة للتبول
- سخونة وجفاف الجلد
- رائحة أستون في النفس.

في حالة الطوارئ اتصل على الرقم ثلاثة أصفار (000) لطلب الإسعاف.

تعلم الإسعافات الأولية. تفقد الموقع www.stjohn.org.au أو اتصل على الرقم 1300 360 455.

© St John Ambulance Australia. لا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج هذه المعلومات بدون إذن خطي مسبق من الناشر. والمعلومات هذه ليست بديلاً للتدريب على الإسعافات الأولية. توصي جمعية St John بأن يتدرب الجميع على الإسعافات الأولية.