

癲癇的急救方法

徵兆和症狀

病患可能會：

- 突然發出叫喊
- 倒下
- 臉部和頸部充血及變藍
- 痙攣及肌肉抽搐
- 口吐白沫
- 咬到舌頭
- 大小便失禁

處理方法

1. 癲癇時：

- 切勿強行約束病患。
- 切勿放任何東西進嘴里。
- 除非身處危險，切勿移動病患。
- 保護病患免受傷害。

2. 癲癇後：

- 遵循 DRSABCD。
- 抽搐停止時，病患嘔吐或病患嘴里有食物或分泌物，都要將病患側臥。
- 處理癲癇期間所導致的傷害。
- 切勿試圖喚醒睡著了的病患，但要持續檢查呼吸和反應。

3. 以下情況請致電三個零（000）叫救護車：

- 抽搐持續多於5分鐘。
- 持續性的痙攣。
- 病患受傷了。
- 病患有糖尿病史。

在緊急時請致電三個零（000）叫救護車。

若需要更多聖約翰急救培訓和急救用品的資訊，請瀏覽 www.stjohn.org.au 或致電 1300 360 455。

© St John Ambulance Australia. 所有資訊如沒有書面同意之下不可複製。此資料不可取代任何急救課程。
聖約翰建議民衆應有急救的培訓。