

# 被蜘蛛咬的急救方法

## 徵兆和症狀

- 傷處刺痛
- 大量出汗
- 噁心，嘔吐及腹痛

## 被漏斗網蜘蛛咬傷的特有症狀：

- 大量的口水分泌
- 意識混亂直到不省人事
- 肌肉痙攣及呼吸困難
- 微小的毛髮豎起
- 嘴唇麻痺
- 大量的眼淚分泌
- 精神混亂
- 脈搏加速
- 血壓上升

## 被紅背蜘蛛咬傷的特有症狀：

- 局部極度疼痛會越來越嚴重及擴散
- 微小的毛髮豎起
- 局部的出汗
- 頭痛
- 肌肉無力和抽搐

## 被其它蜘蛛咬傷的特有症狀：

- 傷處有灼熱感
- 腫脹
- 起水泡

## 處理方法

1. 遵循 DRSABCD。
2. 讓病患躺下。
3. 安慰病患。
4. 執行處理方法：

### 漏斗網/鼠蜘蛛 (mouse spider)

1. 若肢體被咬，儘快使用寬的壓迫綑帶（綑織布）包紮傷口。
2. 從手指和腳趾的上方開始施行壓迫包紮法，包紮越多肢體部分越好。
3. 確保病患不要有任何活動。
4. 確保已致電三個零（000）叫救護車。

### 紅背蜘蛛

1. 使用冷敷來減少疼痛。
2. 尋求醫療援助。

### 其它蜘蛛

1. 用清水和肥皂清洗傷處。
2. 使用冷敷來減少疼痛或不適的感覺。
3. 若病患出現嚴重症狀，請尋求醫療援助。

在緊急時請致電三個零（000）叫救護車。

若需要更多聖約翰急救培訓和急救用品的資訊，請瀏覽 [www.stjohn.org.au](http://www.stjohn.org.au) 或致電 1300 360 455。

© St John Ambulance Australia. 所有資訊如沒有書面同意之下不可複製。此資料不可取代任何急救課程。  
聖約翰建議民衆應有急救的培訓。