

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ



Διαχείριση δηλητηρίασης

Σημάδια και συμπτώματα

Τα σημάδια και τα συμπτώματα εξαρτώνται από τη φύση των δηλητηριών που έχουν ληφθεί, εισπνευσθεί, απορροφηθεί ή εγχυθεί στο σώμα.

- κοιλιακό άλγος (πόνος)
- υπνηλία
- πόνοι καύσου από το στόμα έως το στομάχι
- δυσκολία στην αναπνοή
- σφίξιμο στο στήθος
- θολή όραση
- οσμές στην αναπνοή
- αλλαγή στο χρώμα του δέρματος, με μπλε απόχρωση γύρω από τα χείλη
- αιφνίδια κατάρρευση

Διαχείριση

1. Ακολουθήστε το σχέδιο δράσης DRSABCD.

Εάν ο ασθενής είναι αναίσθητος

1. Διασφαλίστε πως έχει γίνει κλήση για ασθενοφόρο: τρία μηδενικά (000).
2. Καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία εάν η ατμόσφαιρα έχει μολυνθεί με καπνό ή αέριο.

Ασθενής που διατηρεί τις αισθήσεις του

1. Ακούστε τον ασθενή και καθησυχάστε τον, μην τον συμβουλευέτε.
2. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τι είδους δηλητηρίου έχει ληφθεί.
3. **Καλέστε το 13 11 26 για το Κέντρο Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων.**
4. Στείλτε τυχόν έμετο, συσκευασίες και /ή σημειώματα αυτοκτονίας μαζί με τον ασθενή στο νοσοκομείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ προκαλείτε έμετο, εκτός κι αν σας συμβούλεψαν να το κάνετε από το Κέντρο Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων (Poisons Information Centre).
- ΜΗΝ δίνετε τίποτα από το στόμα.
- Ξεπλύνετε τις ουσίες από το στόμα και το πρόσωπο με νερό.

Σε επείγουσα ανάγκη καλέστε τα τρία μηδενικά (000) για ασθενοφόρο.

Μάθετε Πρώτες Βοήθειες. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.stjohn.org.au ή καλέστε 1300 360 455.

© St John Ambulance Australia. Αυτή η πληροφορία δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Η πληροφορία αυτή δεν αποτελεί υποκατάστατο για την παροχή πρώτων βοηθειών. St John συνιστά ότι ο καθένας πρέπει να εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών.