

CONVULSIONI FEBBRILI



Come intervenire nel caso di convulsioni febbrili nei lattanti e nei bambini

Le convulsioni nei lattanti e nei bambini potrebbero essere causate da febbre, infezioni, epilessia o altri disturbi. Le convulsioni febbrili sono solitamente brevi, di durata non superiore ai 5 minuti.

Segnali e sintomi

- febbre
- irrigidimento muscolare
- movimenti spasmodici o "a scatto" di volto e arti
- ribaltamento degli occhi verso l'alto
- volto e labbra di colorito blastro
- perdita di conoscenza.

Gestione dell'emergenza

1. Durante la convulsione:
 - mettete il bambino sul pavimento per garantirne la sicurezza
 - girate il bambino sul fianco
 - NON immobilizzate il bambino.
2. Dopo la convulsione:
 - seguite il piano d'azione DRSABCD
 - togliete indumenti o fasciature in eccesso
 - se necessario, richiedete le attenzioni del medico.

AVVERTENZA

NON raffreddate il bambino bagnandolo con una spugna o mettendolo nella vasca da bagno, ma togliete invece gli indumenti in eccesso.

In presenza di un'emergenza, telefonate allo 000 per richiedere un'ambulanza.

Imparate i protocolli del pronto soccorso. Visitate il sito www.stjohn.org.au o chiamate il numero 1300 360 455.

© St John Ambulance Australia. Le presenti informazioni non possono essere copiate o riprodotte senza il previo consenso scritto dell'editore. Queste informazioni non sono un valido sostituto per la formazione nel campo del pronto soccorso. La St John consiglia a tutti di seguire corsi di pronto soccorso.