

# ICTUS



*Come intervenire nel caso di un ictus*

## Segnali e sintomi

- Improvvisa riduzione del livello di coscienza
- Debolezza o paralisi, soprattutto su un lato del corpo
- Sensazione di torpore nel volto, nel braccio o nella gamba
- Difficoltà a parlare o a comprendere
- Capogiri senza una valida spiegazione
- Vista disturbata
- Perdita di equilibrio
- Confusione.

## Gestione dell'intervento

1. Seguite il piano d'azione DRSABCD.

### Se il paziente è cosciente

- Calmate e rassicurate il paziente.
- Tenete sollevati il capo e le spalle appoggiandoli su cuscini.
- Allentate capi di vestiario aderenti.
- Mantenete la temperatura corporea a livelli normali.
- Togliete con un panno secrezioni dalla bocca.
- Sinceratevi che le vie respiratorie siano libere ed aperte.

### Se il paziente non è cosciente

- Mettere il paziente nella posizione laterale di sicurezza.
2. Sinceratevi che sia stata richiesta un'ambulanza telefonando allo 000.

## National Stroke Foundation

[www.strokefoundation.com.au](http://www.strokefoundation.com.au)

Se notate i segnali di un ICTUS, agite tempestivamente:  
**(FAST)**

- Debolezza dei **muscoli del volto (FACIAL)**
- Debolezza delle **braccia (ARM)**
- Difficoltà a **parlare (SPEECH)**
- Agite **tempestivamente (TIME)**

© National Stroke Foundation

**In presenza di un'emergenza, telefonate allo 000 per richiedere un'ambulanza.**

**Imparate i protocolli del pronto soccorso. Visitate il sito [www.stjohn.org.au](http://www.stjohn.org.au) o chiamate il numero 1300 360 455.**

© St John Ambulance Australia. Le presenti informazioni non possono essere copiate o riprodotte senza il previo consenso scritto dell'editore. Queste informazioni non sono un valido sostituto per la formazione nel campo del pronto soccorso. La St John consiglia a tutti di seguire corsi di pronto soccorso.